

KadeFungin® FloraProtect

DR. KADE
PHARMA 

Lactobacillus plantarum I1001

Die Vaginalflora kann sich aus unterschiedlichen Gründen verändern; seien es hormonelle Veränderungen, Stoffwechselstörungen, Stress, Verwendung ungeeigneter Hygieneartikel, vaginale Operationen oder die Einnahme von Antibiotika oder Mitteln gegen Pilzinfektionen.

Die vaginale Anwendung milchsäureproduzierender Bakterien, wie in KadeFungin® FloraProtect enthalten, trägt dazu bei, die normale Scheidenflora wiederherzustellen und gesund zu erhalten.

KadeFungin® FloraProtect enthält *Lactobacillus plantarum I1001*, ein Milchsäure-Bakterienstamm mit besonderen Eigenschaften für die Wiederherstellung der gesunden Scheidenflora und guter Fähigkeit zum Anhaften an der Vaginalschleimhaut. Lactobazillen stabilisieren den physiologischen pH-Wert der Vagina durch die Bildung von Milchsäure und unterstützen die natürlichen Abwehrmechanismen gegen Scheideninfektionen. Darüber hinaus besiedeln sie die Schleimhaut der Vagina und bilden dort eine Schutzschicht, die die Ansiedlung anderer, unerwünschter Mikroorganismen verhindert.

Wann ist KadeFungin® FloraProtect anzuwenden:

KadeFungin® FloraProtect kann in jeder Situation angewendet werden, in der sich die Scheidenflora möglicherweise verändert.

Zusammensetzung:

Wasserfreie Lactose, Cellulose, *Lactobacillus plantarum*, Hydroxypropylmethylcellulose, Croscarmellose-Natrium, wasserfreie Zitronensäure, Magnesiumstearat, Kieselöl.

Eine Vaginaltablette KadeFungin® FloraProtect enthält mindestens 100 Millionen nützliche Mikroorganismen.

Dosierung:

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
			1	2	3	4
Regelblutung						 11
	13		15		17	
19		21		23	24	25
26	27	28	29	30		

Die Packung enthält 7 Vaginaltabletten, von denen jeden zweiten Tag je 1 Tablette angewendet wird. Im Fall von antibiotischen oder Scheidenpilz-Behandlungen ist mit der Anwendung von KadeFungin® FloraProtect nach Abschluss der Behandlung zu beginnen.

Bei anhaltender Veränderung der Scheidenflora sollte die Behandlung nach diesem Anwendungsmuster im folgenden Monat wiederholt werden.

Wenn Sie eine Vaginaltablette vergessen haben, holen Sie die Anwendung so bald wie möglich nach, um das empfohlene Anwendungsmuster beizubehalten.

KadeFungin® FloraProtect darf nicht während der Menstruation angewendet werden.

Art der Anwendung:

Vorzugsweise vor dem Schlafengehen.



1. Ziehen Sie die Blisterfolie in Pfeilrichtung vorsichtig ab.
2. Entnehmen Sie die Tablette vorsichtig und stecken Sie sie in den Applikator.
3. Führen Sie den Applikator in Rückenlage mit leicht angewinkelten Beinen in die Vagina ein.
4. Drücken Sie auf die seitlichen Griffe des Applikators, um die Tablette in der Vagina zu platzieren.

5. Reinigen Sie den Applikator mit Wasser und Seife für die nächste Anwendung.

Sollte die Tablette versehentlich brechen, behält sie ihre Eigenschaften bei und kann trotzdem angewendet werden.

Packungsgröße:

Packung mit 7 Vaginaltabletten und 1 Applikator.

Gegenanzeigen:


Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe wenden Sie das Produkt bitte nicht an.

Vorsichtsmaßnahmen:

Obwohl keine Nebenwirkungen zu erwarten sind, wird empfohlen, das Produkt nicht weiter anzuwenden, sobald Sie Beschwerden oder Reizungen im Vaginalbereich feststellen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt.

Hinweise:

Vor Gebrauch des Produkts sind die Hände zu waschen. Bewahren Sie das Produkt für Kinder unzugänglich auf. KadeFungin® FloraProtect muss nicht im Kühlschrank gelagert werden, ein kühler (nicht über 25 °C) und trockener Aufbewahrungsort wird jedoch empfohlen. Nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

 PharmaKERN Portugal, Lda.
Av. do Forte, n.º 3, Edif. Suécia I,
Piso 0, salas 1.04 e 1.29
2794-038 Carnaxide, Portugal

Vertrieb:
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistraße 2
12277 Berlin, Deutschland

Tel.: +49(30)7 20 82-0
Fax: +49(30)7 20 82-200
E-Mail: info@kade.de
www.kade.de
www.kadefungin.de



Rev. 02/2018

K2733
G1689-04